海藏痘論萃英

田氏保嬰集

種痘心法

種痘指掌

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

海藏癍論萃英

王好古著

本館叢書集成初編所選濟生拔萃及古今醫統正脈全書皆收有此書濟生元刊本故據以影印

瘡疹摽本

昔睦親官十大尉病瘡疹衆醫治之王曰疹未出屬何藏腑
醫言胃氣熱一醫言傷寒不退一醫言在母腹中有毒錢氏
曰若言胃氣熱何以不熱若言母腹中有毒屬何藏也
醫曰在脾胃錢氏曰良在脾胃何以驚悸錢曰夫胎在腹中
月至六七則已成形食母穢液入兒五藏食至十月滿胃
中至生之時口有不潔產母以手拭淨則無疾病俗以黃連
汁塗之方下腊糞及涎穢也此亦母之不潔餘氣入兒藏中
本先因微寒入而成瘡疹未出五藏皆兒病證內一藏受穢
多者乃出疹疹初欲病時先呵欠頓悶驚悸乍涼乍熱手足
冷面腮赤燥欬嗽噴嚏此五藏證俱也呵欠頓悶肝也時發

驚悸心也不涼不熱手足冷脾也面赤腮頰赤嘖嗳肺也惟腎無候以在府下不能食穢故也凡瘡疹乃五藏毒若出歸一證肝水疱肺膿疱心斑脾疹惟腎不食穢毒而無諸證瘡黑者屬腎由不慎風冷而不飽內虛也又用抱龍丸數服愈以其別無他候故未發出則見五藏證已出則歸一藏矣

海藏云本先因微寒入一句并由不慎風冷而不飽內虛一句勿認作寒證當識用抱龍丸即知斑疹多熱也

治小兒壯熱昏睡傷風風熱瘡疹傷食皆相似未能辨認間服升麻葛根湯惺惺散小柴胡湯甚驗蓋此數藥通治之不致誤也惟傷食則大便酸臭不消化畏食或吐宜以藥下之

海藏云傷食宜以藥下之者當詳其所傷何物生硬寒熱不等不可遽用巴豆之類大毒之藥下之升麻葛根湯太陽陽

明也惺惺散風熱咽不利脾不和少陽渴小便不利也小柴胡湯往來寒熱胸脇微痛少陽也然欲知其經當以脉別之小兒耳冷骭冷手足乍煖乍凉面赤時嗽時嚏驚悸此瘡疹欲發也未能辨認間服升麻湯消毒散已發未發皆宜服仍用胡麥酒黃栢膏暑月煩燥食後與白虎湯王露散熱盛與紫雪咽喉或生瘡與甘桔湯甘露散餘依錢說大人小兒同治法惟劑小大不同耳

海藏云消毒散太陽藥白虎湯治身熱目疼鼻乾不得卧陽明藥也正為泄時者之劑甘露飲子肺腎藥也甘桔湯少陰藥也紫雪天門冬麥門冬黃芩地黃為血劑王露散肺腎藥石膏寒水石為氣劑

升麻葛根湯 方在前保命小兒門內

海藏云太陽陽明之劑

薄荷散 治傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和

桔梗　細辛去葉　人參　甘草炒　白茯苓去皮
白朮　括蔞根各一兩

右同為細末每服二錢水一盞入薄荷五葉煎至七分温服如要和氣入生姜五片同煎用防風一分用川芎一分此又一法海藏云此加減四味亦各隨經證也

消毒散 治瘡疹未出或已出未能勻遍又治一切瘡涼膈去痰治咽喉痛

牛蒡子二兩炒　甘草半兩炒　荆芥穗二分半

右同為麤末每服二錢水一盞半去柤温服

海藏云此前所註皆温平之劑一法加防風薄荷

治瘡疹已出用此藥塗一面次用胡荽酒外治法

黃蘗壹兩　新豉壹兩半　甘草肆兩

右同為細末生油調從耳前至眼匡並厚塗之日二兩次如早用瘡不至面縱有亦少

胡荽酒　胡荽細切四兩以好酒二盞煎一二沸入胡荽再煎少時用物合定放冷右每吸一兩口徐噴從頂至足勻遍勿噴頭面病人左右常令有胡荽即能辟去汗氣瘡疹出快

治瘡疹出不快及倒撒

紫草茸　木通剉　甘草剉炒　枳殼麩炒去穰

右同為麤末每服一錢水一中盞煎至八分溫服無時

治心胃熱咽痛口舌生瘡并瘡疹已發未發並可服之又治熱氣上攻牙齦腫重齒動搖

生地黃　熟地黃　天門冬去心麥門冬去心枇杷葉去毛
枳殼麩炒去穰　黃芩去心　石斛去苗　甘草剉炒　山茵蔯葉
右各等分爲麤末每服二錢水一盞食後溫服牙齒則含漱
并服

海藏云甘露飲爲良劑

【瀉青丸】方在保命小兒條下

海藏云東垣先生治癍後風熱毒翳膜氣翳遮睛以此劑瀉
之大効初覺易治

【補肝丸】四物湯內加防風羌活等分爲
細末煉蜜爲丸是也

【鎮肝丸】瀉青丸去梔子大黃　治肝虛

【地黃丸】治胃虛解顱即賤病也治脉毛而虛

熟地黃揚分　山茱萸　乾山藥　澤瀉
牡丹皮　白茯苓各肆分
右爲末煉蜜丸如桐子大三歲已下一二丸或三五丸空心
温水下

瀉火　治脉洪而實前地黃丸熟地黃改生地黃去山茱萸是
也此治左手本部脉若右尺洪實以鳳髓丹瀉之此地黃丸
仲景八味丸去桂附若加五味子腎氣丸也此益肺之原以
生腎水焉

瀉白散　瀉肺脾熱目黃口不吮乳喘嗽
桑白皮一兩剉炒黃　地骨皮一兩　甘草半兩炒
右爲細末每服一二錢水一盞入粳米百粒同煎食後服
易老加黃連

海藏云治肺熱傳骨蒸自汗用此以瀉之梔子黃芩亦能瀉肺當以氣血分之

阿膠散 補肺

阿膠一兩半炒 馬兜苓半兩 甘草二分半炙 黍粘子二分半炒香 杏仁一七個去皮尖 糯米

右為末每服一二錢水一盞食後

海藏云杏仁本瀉肺非若人參天門冬麥門冬之補也當以意消息

瀉肺散 泄丙 方在保命小兒條下

瀉心湯 瀉丁

黃連一兩去須

右為極細末每服一字至半錢一錢臨卧温水調下

海藏云易老單瀉心湯加減法出於此乃實邪也實則泄其子

補脾　青皮　呵子肉　甘草各半兩　陳皮壹兩　丁香貳分

右為細末每服二錢水一盞煎服

海藏云此劑瀉脾以燥濕

瀉脾　瀉脾熱目黃口不能吮乳

藿香葉柒分　山梔子仁貳兩　石膏半兩　甘草叁兩　防風肆兩

右剉同蜜酒微炒香為細末每服一錢至二錢水一盞煎清汁服　海藏云此劑瀉肺熱

白朮散　藿香葉　白朮　木香　白茯苓　甘草炒　人參各一兩　乾葛貳兩劉

右為末每服一錢至二錢水煎如飲水者多煎與之
海藏云四君子湯加減法治濕勝氣脫泄利太過

生犀湯（生犀鎖取末貳分　地骨皮　赤芍藥　柴胡　乾葛各壹兩　甘草半兩炙）

右為末每服一二錢水煎
海藏云此少陽陽明相合也

檳榔橘皮湯（檳榔　橘皮　甘草各半兩　牽牛熏兩半生用）

右為極細末三二錢蜜湯調下半錢已上一錢食前（易老加熟用防風）
海藏云與通膈九相上下氣血也

通聖九（大黃　牽牛　木通各等分）

右為細末滴水丸粟粒大每服二三十九量虛實加減

溫中和氣治吐泄思食凡小兒虛冷病先與數服以調其氣

人參　茯苓　白朮　甘草　陳皮各等八分

右為細末每服二錢水一盞生姜五片棗一枚同煎

海藏云四君子補脾湯加減法

草龍膽　防風　青黛研各二分龍腦壹分

鉤藤　黃連五分　牛黃　麝香

右為細末麪糊丸粟米大每服一二十丸金銀湯下

治盜汗

牡礪燒　黃耆　生地黃各等分

右為末水煎

治一切熱兼治瘡疹有神

連翹　防風　梔子　甘草

右為末水煎

海藏云治熱在外而不厥此少陽藥也

治小兒瘡豆已出未出並可服之

紫草　昔升麻　甘草炙各等分

右㕮咀水二盞粳米五十粒同煎此乃陽明之藥也

治小兒瘡疹

紫草　木通　人參　茯苓　粳米各等分

甘草減半

右為末每服四錢水煎此小便不利之劑也

治小兒瘡豆欲出未能得透皮膚熱氣攻咽喉眼赤心煩

鼠粘子（四兩炒）荊芥穗（一兩）甘草（一兩）防風（半兩）

右爲細末沸湯點　臨卧大利咽喉化痰涎止嗽老幼皆宜

海藏云太陽少陽藥也首論溫平者此也

治斑瘡　治瘡子或出不快

白芍藥（一分）酒調如欲止痛只用溫熱水調下

海藏云張和之治四肢出不快加防風大効此正旳太陰藥也

治斑瘡　治小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛

桔梗（一兩）甘草（生二兩）牛蒡子（炒一兩）麥門冬（去心半兩）

右爲末竹葉同煎細細服

犀角地黃湯　方在拔粹內脉訣中

潔古老人斑論

論曰斑疹之病其爲證各異瘡發燉腫於外者屬少陽二焦相

火也謂之痘小紅黯行皮膚之中不出者屬少陰君火也謂之疹凡顯痘證若自吐瀉者慎勿亂治而多吉謂邪氣上下皆出也大凡瘡疹首尾皆不可下恐妄動而變此謂少陽通表宜和之也當先安裹解毒次微發之安和解毒須安五臟防風湯是也如大便不澁者須微發之藥錢氏方中甚多宜選用之如大過秘宜微利之當歸丸裹變百祥丸是也初知痘疹若使之痘疹併出小兒難禁是以別生他證也首尾不可下者首曰上焦尾曰下焦若能吐利猶不可下也便宜安裹若不吐瀉者先安裹藥二三五服如能食而大便秘結內實者宜疎利之若內虛而利者宜用裹藥末後一服調微發之藥服之大抵安裹之藥多發表之藥少秘則微疎之令邪氣不壅併而能作苗次使兒易禁也身溫煖者順身涼蔡者逆

者宜多服防風湯和之安裹若大便實秘能飲食而內實宜當歸丸微利之

解毒防風湯 防風一兩　地骨皮　黃耆　芍藥　荊芥　枳殼　柔粘子各半兩

右為麤末每服四五錢水煎

當歸丸 當歸半兩　甘草一分　黃連　大黃各一分半

右先將當歸燉膏子入藥末二味為丸漸加服之以利為度

秦艽白朮丸 治斑疹大便秘結

紅牙大戟去骨　青州棗去核三十个

右用水一椀同煎至水盡為度去大戟不用將棗焙乾可和作劑旋丸從少至多以利為度

海藏老人斑論

夫痘之為病皆由子在母腹中時浸漬食母血穢蘊而成毒皆
太陰濕土壅滯君相二火之所作也因小兒真氣既盛正氣
又王邪無所容或因天冷或因傷表或因傷裏痘由是而生
焉治當何如外者外治內者內治中外皆和其痘自出至於
惡寒者發之表大熱者奪之渴者清之大便秘結者下之小
便不通者利之驚者安之泄者分之可以執一為哉大抵傷
寒同治最為高論隨經用藥不可關也假令五日已裏諸病
與痘疹不能別辨者不可疑作痘疹以須發之但各從其所
傷應見治之皆不效痘出若強發之其變不可勝數矣前人
言首尾俱不可下者何也曰首不可下者為痘未顯於表下
則邪氣不得伸越此脉證有表而無裏故禁首不可下也尾
不可下者為痘毒已顯於外內無根帶大便不實無一切裏

證下之則痧氣逆陷故禁尾不可下也有如所言温煖蓋覆不令通風以其痧未出或身表凉而惡寒或天令寒而惡冷温煖蓋覆不令通風也痧若已出身熱天暄何必用蓋覆而不使之通風乎後人執此二句首尾俱不敢下温煖不令通風不知天令之所加人身之所感致使悞人多矣大抵前人之言隨時應變以其所可者而言之後人不知其變故執常而不移也噫首尾俱不可下者以其始終藏府元無凝滯也若有一切裏證及大便結者安得不下温煖不使之通風以其發在冬時故如此也若發在夏時痧雖未出亦不用於此也痧之用藥大率以脉爲主浮中沉之胷平舉按之候察其虛實定其中外則可以万全矣

未顯痧證所用之藥

外傷升麻湯主之　內傷枳實丸主之
大便燥者枳术丸主之　若傷冷者温之神應丸主之
惡寒者發之宜防風蒼术湯
表大熱者奪之此表者通言二陽也夫陽盛則氣必上行言奪者治法不令上行也
渴者清之大渴者白虎湯小渴者凉膈散
大便秘結者下之桃仁承氣湯四順飲子柴胡飲子選用緩其在氣在血
小便不通者利之導赤散八正散之類當求上下二焦何經而用之驚者安之凉驚丸重者鴻青丸
泄者分之寒則異功散四君子湯熱則澤瀉茯苓湯
已顯無證所用之藥

出不快　化毒湯
出太多　犀角地黃湯　地骨皮鼠粘子湯
咽不利　桔梗甘草鼠粘子湯
煩者　桔梗甘草梔子湯
肺不利　紫草前甘草枳殼湯
太陽出不快　荊芥甘草防風湯
陽明出不快　升麻加紫草湯
少陽出不快　連翹防風湯
四肢出不快　防風芍藥甘草湯

瘡疹輕重候

凡出未而發搐者是外感風寒之邪內發心熱之所作也當用荅粉下鮮毒犀角地黃湯主之

一發便密如針頭形勢重者合輕其表而凉其內連翹升麻湯
若斑已發密重微喘飲水者有熱證用去風藥微下之
若出不快清便自調知其在表不在裏當微發散升麻葛根湯
若青乾黑陷身不大熱大小便澁則是熱在內煎大黃湯下
宣風散
若身表大熱者表證未罷不可下
若瘢疹已出見小熱小便不利當利小便八正散
若已發後有餘毒未散復有身熱瘡腫之類當用茶粉下解
毒丸瘡疹已出後有聲音者乃形病氣不病也瘡疹未出
先聲音不出者乃形不病而氣病也若瘡疹出而聲音不
出者是形氣俱病也當清其肺氣宜用八風湯并凉膈散
去硝大黃亦可

海藏斑論萃英終

田氏保嬰集

撰人未詳

本館據濟生拔萃
本影印初編各叢
書僅有此本

田氏保嬰集

田氏保嬰集

月裏生驚

急取豬乳細研辰砂牛黃各少許調抹口中神効乳母服防風通聖散二劑其驚自銷

月裏生赤

肌膚赤如丹塗者先用牛黃散托裏續後用鹽葉散塗外乳母服清凉飲子二大劑

月裏生嘔

先用朱砂丸下之如利後用朱沉煎隊其邪氣惡物自下而不嘔也

月裏生黃

因母受濕熱傳於胎也乳母宜服生地黃湯

生下不大便

治法先用硬葱針任肛門如大便不下後用牛黃散送朱砂丸一時自見

春日病溫

凡遇溫病未滿三日先用惺惺散二服後四五日不解煩渴乾嘔用白木散如自汗口燥用製白虎湯至六七日大便燥結用四順飲子下心腹大實大滿牛黃通萬丸下初覺之時疑是瘡疹只宜用葛根升麻湯解肌

夏日吐瀉

凡小兒盛暑吐瀉邪熱在下則瀉在上則吐亡津必渴用玉露散雖吐時時與啜之過三日不愈身熱脉大小便黃用五苓益元各半熱湯調溫飲之身涼脉細小便清早辰益黃散午

後王露散過四五日如困弱宜服異功湯和中丸開胃丸

秋日泄痢

治泄痢活法機要二十五論內甚多宜選而用之

冬日咳嗽

治咳嗽方前發明內甚多宜選而用之

五藏病

治法曰肝熱則手撏衣領瀉青丸主之

肺熱則手揩眉毛甘桔湯主之

心熱則上竄咬牙導赤散主之

脾熱則目黃肚大瀉黃散主之

腎虛則下竄畏明地黃丸主之

急慢驚風

潔古曰急驚者陽證也客熱於心因聞大驚宜用涼驚丸道未
散瀉青丸瀉肝丸地黃丸搐止宜服安神丸
慢驚者陰證也因吐瀉病久脾胃虛損似搐而不似搐亦名
瘈瘲脉有力先用宣風散導之後用益黃散平之天麻防風
丸亦可
大凡小兒過煖生熱熱極生風提抱生癡餵飼生癖也
嘔吐
凡有嘔吐不止者皆宜朱沉煎定吐紫金錠用無不効也
重舌
治法竹瀝清黃柏末點舌上如不愈後用真蒲黃傳之不過三
次愈
木舌

治法用局方中紫雪一分竹瀝半合和之時時抹入口中自消

鵝口

小兒初生口有滿舌治法用髮纏指頭蘸井花水揩拭之後用黃丹鍛出火氣摻於上自愈

口瘡

治法乳母同兒宜服洗心散瀉心湯然後用黃蘗末青黛研細摻之

撮口

治法宜用白殭蠶末蜜調塗兒口又用牛黃一錢竹瀝一合時時抹入口中即瘥

解顱

治法宜用生乾地黃散

夜啼

治法宜五味子散亦宜用燈花七枚研細乳汁送下立已

癢耳

治法宜紅玉散摻之

鼻疳

治法先用甘草白礬水洗淨後摻蘆會黃連黃蘗末日二上

脫肛

治法宜用蒲黃一兩豬脂二兩煉豬脂和蒲黃成膏塗腸頭上即縮入

便青

因驚氣內感脾氣不和治法宜服白术湯

頰赤

由心藏邪熱上攻也宜服導赤散

弄舌

脾藏微熱舌絡緊也治法勿用冷藥下之當少與瀉黃散若肥實者用牛黃散治之

赤流

治法宜服犀角散一法先鎌去惡血服上藥一法用牛膝一兩去苗甘草半兩生剉碎水煎一大盞去滓調伏龍肝塗之

重痛

其候哭啼俛仰坐卧不安自按心腹時時大叫面無正色或青或黃屢慢而白目無精光口吐涎沫此為重痛宜服安虫散

客忤

因而驚忤者治法用竈中黃土貳兩研雞子壹枝去殼一件相和入少

許水調先以桃柳湯浴兒後將此藥塗五心及頂門上
眉煉
治法用青金散傳之如不愈燒小麥存性研細好油調塗
瘡癬
治法浸淫瘡宜用苦瓠散塗之乾癬宜用羊蹄根絞自然汁調
膩粉塗之濕癬宜用青金散貼之
暴喘
俗傳為馬脾風也大小便硬宜急下之用牛黃散奪命散後用
白虎湯平之
偏墜
宜服防葵丸令兒坐於土中午時灸印下偏墜之處七壯
便難

便難燥結兒或澁藥腹脹悶乱命在頃刻可用握管充以男左女右手握之不移時大小便自利也

辨小兒病證

目赤兼青者發搐也　目直而青身反折者生驚也

口吐涎沫而叫者重痛也

咬牙甚者發驚也

昏睡喜嗽悸者將發瘡疹也

吐瀉昏睡露睛者胃虛熱也　吐稠涎咯血者肺熱也

吐瀉昏睡不露睛者胃實熱也　瀉青白穀不化者胃冷也

吐瀉乳不化者傷食也宜下之　身熱飲水者熱在內也

瀉黃紅赤黑者脾胃熱毒也　呵欠面赤者風熱也

身熱不飲水者熱在外也　呵欠面青者驚風也

呵欠面黃者脾虛驚也　呵欠而多睡者內熱也

阿犬氣熱者傷風也

錢氏得効大青骨方在前保命集小兒條下

[illegible]方在前痙論並夾內

[illegible]方在前保命集小兒條下

[illegible]治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱

知母　炙甘草　半夏洗七次　銀州柴胡去芦

人參去頂　地骨皮　赤茯苓已上各等分

右為細末每服二錢生姜五片水煎食後溫服量大小加減

[illegible]治證同前

生犀鎉末　地骨皮　赤芍藥　柴胡

葛根各壹兩　炙甘草半兩

右為麤末每服一二錢水煎食後溫服

益黃散 方在前茶英內

安神丸 治心虛肝熱面黃煩赤壯熱驚啼神志恍惚不寧

麥門冬去心 馬牙硝 白茯苓 乾山藥
寒水石研 甘草各半兩 朱砂壹兩研 龍腦壹錢研

右為細末煉蜜丸如雞頭大每服半丸沙糖水化下無時

導赤散 方在前保命小兒條下

導赤散有連翹 方在後衛生寶鑑小兒條下

大黃實丸 治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連 黃連 廣木香 白蕪荑去扇
雷丸 青皮去白 鶴虱微炒已上各半兩 麝香貳分另研

右為細末粟米飯和丸如綠豆大米下一二十丸無時

宣風散 方在前茶英內

消毒散 方在前萃英內

郁李丸 治極稚小兒大便不通小便澁滯并驚熱咳實欲得潰動者

郁李仁壹兩 川大黃壹兩酒浸炒 滑石半兩

右另為末將郁李仁研為膏和末為丸如黍米大量兒大小與之以乳汁或薄荷湯下食前

瀉黃丸 方在保命小兒條下

瀉白丸 方在萃英內

瀉黃丸 方在萃英內

調肝散 治瘡疹太盛宜服令瘡不入眼

生犀貳分 龍膽壹分 黃耆半兩 大黃貳分 桑白皮半兩炒黃 麻黃壹分去節 釣藤子壹分 石膏半兩 麥門冬去皮 甘草炒各貳分

右為麝末每服二錢水煎食後温服微利効

生地黃湯治小兒生下胎黃

生地黃　赤芍藥　川芎　當歸　瓜蔞根各等分

右㕮咀每服五錢水煎乳母服時時少抹入兒口中

犬糞丸治小兒泄瀉青白膿血相雜

黃連壹兩用吳茱萸炒後去茱萸　茸蔻弐个　木香壹分一味炒熟為丸

右為細末麪糊為丸黍米大赤痢粟米飲下白痢厚朴湯下空心

防風湯治小兒邪熱在表惡風惡寒所傷瘡疹未出可解表發瘢疹

防風半兩　蒼朮　石膏各壹兩　炙甘草半兩

川芎　黃芩各弐分半

右為麗末每服二錢生姜三片薄荷七葉水煎日二

蟬蛻飲子 方在寶鑑小便不通條下

八正散 方在寶鑑氣分熱條下

滑石通氣湯 治小兒瘡疹結燥百無一失方在前雜症畜血證條下

生地黃散 治痲疹後寒熱往來嗜臥煩燥悶亂

生地黃 當歸 地骨皮 人參 甘草炙 赤芍藥

右等分㕮咀每服水煎服無時

苦瓠散 小兒浸淫瘡漸長不止

苦瓠二兩 蛇蛻皮半兩燒灰 露蜂房半兩微炙 掃上塵一豆合

右為細末生油調塗故帛上貼

天麻防風丸 治小兒驚風身熱喘麤多睡驚悸手足搐掣精神

昏憒痰涎不利熱風溫

天麻　防風　人參各壹兩　蝎尾去毒半兩　甘草
朱砂　雄黃各貳分半　牛黃壹分　麝香壹分　姜蚕炒黃半兩

右爲細末煉蜜丸櫻桃大朱砂爲衣每服一丸薄荷湯下無時

牛黃寒驚散治小兒肺脹喘滿胸高氣急兩肋扇動階下作坑兩鼻竅張顧乱嗽渴聲嗄不鳴痰涎潮塞俗云馬脾風若不急治死在朝夕

白牽牛一兩半生半熟　黑牽牛一兩半生川大黃　檳榔各一兩

右爲細末三歲兒每服二錢冷漿水調下涎多加臘粉少許無時加蜜少許

治小兒嘔吐不止

朱砂弍分水飛　沉香弍分　薑香葉三分　滑石半兩　丁香十四个

右爲細末每服半錢用新汲水一盞芝麻油點成花子抄藥在上須臾隆濾去水却用別水送下空心

驚光 小兒驚熱煩燥乳癖

大黃半兩 黃連半兩 龍膽 防風 川芎 薄荷葉各半兩分半

右爲細末麪糊爲丸粟米大青黛爲衣每服三五丸加至二十丸溫水下

蛇虺光 治小兒瘡疹口瘡咽喉腫痛牙疳臭爛

天門冬 麥門冬 玄參各三兩 甘草 薄荷葉各一兩

右爲細末熬生地黃汁和丸櫻桃大每服一丸溫蜜水化服

蜀真細散 小兒蛔疹出不快或倒攝毒氣入腹

紫草茸 黃蘗 桑白皮 木通 枳殼

白术各等分

右為麤末每服二錢水酒各半盞麝香少許同煎

定嘔丸 治小兒一切嘔吐不止　半夏湯洗七次薑製

人參　白朮　木香　丁香　藿香

右六味各二錢半為極細末稀麵糊為丸如李核大後用沉香一錢為末朱砂一錢水飛二味同研勻為衣陰乾每服一丸用小棗一枚去核納藥在內濕紙裹煨熟嚼與小兒服後以米飲壓之

四順飲子　一名清涼飲子方在保命小兒條下

犀角散 治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱夜有盜汗五心煩躁四肢困倦飲食雖多不生肌肉

犀角末　地骨皮　麥門冬　枳殼去穰麩炒　大黃蒸

柴胡　茯苓　赤芍藥　黃耆　桑白皮
人參　鱉甲 塗醋炙焦　已上各等分

右為麤末每服二錢入青蒿少許水煎量兒大小加減

【五味子散】治小兒夜啼及腸痛至夜輒劇狀似鬼祟

五味子　當歸　赤芍藥　白木各半兩　茯神
陳皮　桂心　甘草炙各弍分半

右為末每服量兒大小加減水煎

【紅玉散】治小兒癢耳

白礬火枯　乾胭脂　麝香各壹分

右同研勻先以綿裹杖子撚淨摻之

【金寶散】治小兒虫痛

胡粉炒黃　鶴虱炒黃　川練子去皮核　檳榔各弍分　白礬枯弍分半

右爲細末每服一字大者半錢温米飲調下痛時服

貫衆散 治小兒濕癬浸淫瘡

白礬香三兩研　蛤粉半兩　青黛三分半

右研勻爲細末乾摻瘡上

瀉青丸 治小兒大小便難嘔吐藥食不下命在頃刻

巴豆半生去皮心研出油　硫黄　良薑　附子　檳榔

甘遂各等分

右爲細末粟米飯和丸綠豆大用椒湯洗小兒男左女右手握之用綿裹定看行數多少置藥洗去不用即止

黄耆湯 治傷暑煩渴逆身熱鼻乾燥者是熱入肺經爲客熱呻呼有聲黄耆爲主人參爲佐

黄耆三兩　人參三分半　桑白皮三分　地骨皮炙甘草三分半

右㕮咀水煎放冷時時服之

驚癇散治風熱喘促悶乱不安俗謂之馬脾風者

辰砂半兩（研）　輕粉半分　甘遂壹分半（麪裹煮令乾）

右爲細末每服一字用溫漿水小許上滴小油一點抄藥在上沉下去却漿水灌之立効如神

小兒身躰蒸熱胷膈煩滿皮膚如漬擣之黄白精亦然溫熱所致也宜加減瀉之

黄連　茵蔯各五錢　黄蘗　黄芩各四錢　梔子　茯苓　澤瀉各二分

右㕮咀都作一服水一大盞煎至六分去滓稍熱服食前

小兒孤丸氣偏有大小時時上下者蜘蛛十四枚熬焦桂半兩

二物爲散每服八分一七日再酒調下蜜丸亦通

大人小兒口噤不開牙關者諸藥勿効生天南星末一錢腦子少許相和研勻用指蘸生姜自然汁蘸藥於左右大牙根上揉之立開

灸慢驚風及臍風撮口

小兒慢驚風灸尺澤二穴各七壯在肘中橫紋約上動脉中灶如小麥大

小兒初生臍風撮口諸藥不効者灸然谷穴在內踝前起大骨下陷中可灸二壯鍼入三分不宜見血立効

灸小兒癲癎風癎驚癎

小兒癲癎發瘛脊強低引項灸長強穴三十壯在脊底端跌地取之乃得

小兒癲癎驚風目眩灸神庭穴七壯在鼻直上入髮際五分

小兒風癎灸鼻柱上髮際宛宛中灸三壯灶如小麥大
小兒驚癎先驚怖啼叫後乃發也灸頂上旋毛中三壯及耳後
青絲脉灶如小麥大旋毛中即百會穴也
小兒癖氣久而不痊者灸中脘一穴章門一穴在大橫外直臍
季肋端側卧曲上足舉臂取之右中脘章門各灸七壯臍後
脊中灸二七壯取中脘從鬲俞下取病人四指是穴灸之無
不効也
小兒脇下滿瀉痢躰重四肢不收疫癖積聚腹痛不嗜食痰嚏
寒熱脾俞二穴在十一椎下兩傍相去各一寸五分
又治腹脹引背食飲多漸漸羸瘦黃可灸七壯黃疸者可灸
二壯
灸疳瘦法

小兒疳瘦於脊下鳩尾骨尖上灸二壯次於脊下端尾翠骨尖上灸三壯

小兒疳瘦脫肛躰瘦瀉飲形容瘦悴諸方不差尾翠骨上三寸骨間中灸三壯

小兒身體瘦實腹腫四肢浮脹肩背不舉章門二穴灸七壯

小兒脫肛瀉血秋深不較灸龜尾一壯灶如小麥大脊端窮骨也

小兒脫肛者灸臍中三壯

小兒脫肛久不差及風癇中風角弓反張多哭言語不澤發無時節盛即吐沫灸百會一穴七壯在鼻直入髮際五寸頂中央旋毛中可容豆灶如小麥大

小兒偏墜若洪胎中所有在後生者於莖下腎囊前中間縫子上灸七壯愈

小兒龜胸緣肺熱脹滿攻胸脇所生又緣乳母食熱麪五辛轉更胸高起也灸兩乳前各一寸五分上兩行三骨罅間六處各三壯炷如小麥大春夏從下灸上秋冬從上灸下若不依此法十灸不愈一二也

又一法小兒喘脹俗謂之馬脾風又謂之風喉者以草莖等病兒手中指裏近掌紋至中指尖截斷如此三莖自乳上微斜直上立兩莖交稍尽頭橫一莖兩頭尽頭點下各灸三壯此法多曾見愈

種痘心法

朱奕梁撰

本館叢書集成初編所選借月山房彙鈔及澤古齋重鈔皆收有此書且同一版本借月在先故據以影印

種痘心法序

種痘一科昉乎有宋御纂醫宗金鑑言其要矣至於方法多出於口授心傳或未備敢余幼好歧黃之學廣搜典籍博訪高明間有一得未敢自信誠以醫雖小道實寄生死自非洞垣斷不可漫爲嘗試也比遇明師授以種痘之訣析疑辨異檢訛訂謬得其要領抉其精微閱歷有年頗有成效嘗欲錄爲一編以備參考每不獲暇茲遊大梁客中暇日條列論方以爲一科詳愼簡核可以積德可以養生不

敢自私公諸同好願體天地好生之心勿懷一身營私之念雖無當於大方或有助於幼科也朱奕梁識

種痘心法

國朝朱奕梁撰

論痘源流

天運自北而南地氣自南而北痘疹之源本於父母媾精時慾火藏於嬰孩之命門所謂先天之毒是也上古俗厚人龐益無此患治東漢馬伏波征交趾南方濕熱與相火煽動遂染痘瘡傳入中原流毒嬰孩千百餘年無可預挽宋王文正公之父生子數患痘殤後得文正公旦百計千方預求挽護廣詢醫亟力行善事感天母

降凡神人授術慶衍化流而種痘之法遂傳於世由今推之蓋先天之毒伏於命門外無所感原靜而不動至氣運用事保攝失宜則比戶連村一人乍起傳染殆遍所以少陰司天在泉之歲痘症尤多其有飲食驚恐傷於內風寒跌撲傷於外者遇之輒殆此非痘之殺人良由多症之夾攻勢不支也若夫種痘則飢飽預節溫涼預調神完氣固時疫未作以馴粹之苗引平和之毒是以計日而發應候而收萬全無害譬諸渡江河衝風月浪縱巨儖未免沉覆之虞而風恬浪靜雖小艇亦克濟

於洪流詎得謂人事不能勝天盡委諸氣運也哉

審時熟苗

種痘之派有二其一爲湖州派其法選時痘之極順者取其痂以爲苗是名時苗種出之痘稀密不常時或有失起於秋分之後停止於小滿之前蓋圖利之所爲非仁人之心也其一爲松江派其法專用種痘之痂以爲苗是名熟苗種出之痘稀密視乎胎毒之輕重輕者不過數顆而毒已盡即重者亦不過二三百顆從無通漿合眼諸苦雖酷暑嚴寒並無妨礙良由其苗傳種愈久

則藥力之提拔愈清人工之選練愈熟火毒汰盡精氣獨存所以萬全而無患也若時苗能連種七次精加選鍊即爲熟苗不可不知

選苗

痂不拘大小圓厚色紫明徹無昏濁氣者佳頭面爲上身手爲次腰下至足又其次皆可用惟手心足底紅唇無毫發處及天庭眉心鼻尖人中地閣咽喉枕骨當胸乳尖當臍脊脊各正中等處並前後陰器者俱不可用

收苗

收苗回漿結痂色老四圍起白衣用指甲輕輕挑起揭取為上脫下拾取者為次況脫下遺失尋覓甚難摠宜揭取貴乎恰好太早則傷疤太遲則無及

貯苗

貯苗先選合式之痂用指撚淨浮污預備乾潔竹紙包好寫明日月并孩子姓名以便臨用揀取包不宜用紅箋紙恐損苗故也宜於近身少佩片時以去痂中潮氣則不蒸霉即藏於乾淨磁瓶內置之涼燥之處蓋熱則苗氣易耗穢則苗氣易雜不燥則潮濕相侵不密則鼠

蟲竊損皆所宜避遇暑月及有時疫痘症或預備堅厚竹筒烘晒乾潔納苗包於內亦好須緊塞其口庶苗氣不散疫氣不侵

苗力久暫

苗之大而厚者冬月春初可貯月餘秋末夏初猶可半月盛暑僅可六七日若更薄小焉能耐久

用苗輕重

用苗輕重在量苗之大小厚薄孩之長幼虛實時之寒煖燥濕以斟酌調劑厚大之痂兩三顆足種一孩薄小

者二三十顆不嫌多也大抵孩長而實宜加重孩幼而虛宜減輕時煖而濕宜加重時寒而燥宜減輕此其概也權衡通變在乎臨時

可種不可種

凡孩子生滿百日眄視靈動認生啼笑者即可種至十三四歲皆可種十五以上勿輕種蓋痘瘡最忌穢濁與走洩若男子情竇已開女子天癸已至能保無穢濁走洩之害乎若年長之男必須誠實自惜身命者方可下苗否則痘中走洩登時黑陷立致危殆無藥可救女之

天癸其來以漸服黃阿膠可以力止猶得僥幸於萬一然亦不可不慎摠之孩子種痘不愁太小只愁太大蓋太大則任性自由不容大人調理大而傾危小而痼疾何如兩三歲時不識不知任憑大人調度者之省事乎凡孩子須看兩目瞳人深黑緊小光芒流動便是命門充足根本深固毒雖重而無妨最忌黃淡散大呆滯無神

再診耳尻脈在耳後高骨上并驗中指尖脈動指熱爲相火煽動時痘將發之候不可種

凡有風寒外感飲食內傷諸症須留心調理宜緩種

凡面色痿黃毛髮焦捲皮膚枯裂者不宜種

凡氣臌木腎身有隱病者不宜種

凡頭大頸細肌肉瘦削者不宜種

凡腰細膝大肉軟如棉者不宜種

意見疑惑語言不祥者不宜種

下苗吉日

下苗宜天德歲德月德天德合歲德合月德合母倉開成等日

避忌日辰

忌破閉滿日月忌神在日孩子本命沖尅等日

治苗塞苗法

下苗時選入鉢用杵研細加水再研入和苗丹少許以微有紅色爲度不可太多再研極和乾濕得所大約苗新宜潤苗久宜乾天寒用温水天熱用涼水隨取木棉絮一丸如豆大泡透仍挹乾先展鉢底苗漿再收杵上苗漿務必淨盡勿致狼藉然後令孩子向明用左手拈起苗丸塞入鼻孔男左女右再將乾絮豆許蓋塞苗丸

之外右手取苗杵量鼻淺深拇指掐定送入鼻梁凹處須要恰好太深則傷鼻太淺則苗丸易致脫出苗氣不入徐疾淺深全在手法熟則生巧下苗後須防噴嚏打出苗丸宜仍送進必過五六時方可抽出即不抽出亦並無妨

下苗後兩三時即服稀痘丹五歲內三丸七歲內五丸八九歲以上七丸不拘湯下即入粥飯內亦可若幼不能服者須以少熟水浸透研爛塗母乳頭令兒吮食之務盡勿使狼藉

下苗後五日耳尻脈當動中指尖當熱七日身發熱十日佈點此一定之候也然亦時有不齊者孩體之氣稟有厚薄臟腑之傳送有遲疾肌體之腠理有疎密苗性之久新有馴暴時令之氣化有寒暑是以早者五日而發熱遲者或十二日而發熱要皆自然之理不可以一例拘也故種而不出者必俟十五日後方可覆苗

緩發熱於口鼻上下兩旁先見一點平塌腫硬者為痘標四月八月間多有之急用銀針挑破其心使出紫黯血以洩鼻毒則腫硬消而餘痘易起否則壯熱困人

凡發熱而兩目起紅者是痘將發於目中速用吹耳丹發熱時向來曾有驚風者不免舉發或抽掣搐搦者甚則角弓反張痰壅發厥俱不必張皇靜以待之不可慌治佈點自定從此驚風永除矣

凡發熱作作作止時輕時重不拘一例其以七日爲率者蓋人身內之五藏與外之軀殼相爲配合肺主皮毛心主血脈脾主肌肉肝主筋絡腎主骨髓苗氣之入自外至內每日一藏計五日而至腎五日之後先天之毒被苗氣引動腎中發熱其熱在骨髓外不覺也其候耳

尻脈動中指尖熱目眸子滯而不流六日之後腎傳之肝其熱在筋絡外猶不覺也其候目中帶淚肢體怠倦情若不怡七日之後肝傳之脾其熱在肌肉蒸出皮膚外始覺熱故曰七日發熱也其候飲食減少手足欠伸噓噯作渴八日之後脾傳之心其熱在血脈而體乃大熱其候有若驚恐手足發瘛睡臥不寧九日之後心傳之肺其熱在皮毛而毒氣欲出矣其候胸膈脹滿時作吐噦或有汗出其點始佈故曰十日見點也至十一二日而點齊熱退身涼飲食如故十三四日而起脹十五

六日而化漿十七八日而回漿結痂十九二十日而脫痂收功矣

佈點之後原與時痘相同痘之順症原不必服藥但調理之法宜知約畧三方以備參考如其可已竟不必用種痘之異於時痘者有二一則佈點時痘初覺甚稀而日漸增佈毋至加密種者始雖覺多而日漸減退總歸於稀一則周身無害處所時痘稍違碍便覺費手種者不拘何處並無妨碍凡孩子身抱微疴原須俟其痊可方與下苗乃爲穩當然有父母愛子心迫遇時痘將起

急於要種至親好友情難固辭不得已而種之或本來無病下苗之後調養失宜致滋別症其後收苗之中即帶此病氣如驚風欬嗽頭痛腹疼之類若以此苗種無病之孩至發熱時亦必現所帶病氣之症雖不傷人而孩已受困不可不知此等病苗定當撤去不得復用若犯前顯列不宜種各條斷斷不可徇情濫種也

凡苗專取純一不雜者如以兩孩身出之痂各取幾顆以種一孩將來其痘必多在苗少時或可用此法以養苗但須擇壯實之孩方能堪此不可施之虛弱幼小之

孩也戒之慎之

右種痘條法尤在順天時之寒煖適地性之燥濕調被服之厚薄辨食品之良毒俾寒暑無侵飢飽合節笑啼有度起居有常思過半矣

和苗丹

犀黃一分要色淡層片輕鬆者良黃黃不可用　眞珠二分光圓細白者良要每顆重一二厘可用　丹砂三分如雲母片者良研極細後水飛去膠鄒

右三味各研極細合和再研千杵貯磁瓶聽用

吹耳丹

珍珠一分　丹砂二分

右二味如法研細貯瓶內遇發熱時目起紅色者是痘將出於目中也速將此丹少許左紅吹右耳右紅吹左耳兩目俱紅則兩耳俱吹輕者一次重者兩三次其紅即退凡目疾紅腫者如法吹耳亦效并治耳中脹滿流膿出血等病勿以平淡無奇而忽之

稀痘丹

犀黃五分　珍珠一錢　赤金泊五百張泥細　古墨三錢

青黛三錢 澄去泥砂 丹砂三錢 研細水飛 丹砂一錢爲衣 滑石二兩

右七味各研極細和勻再將升麻一兩紫草一兩甘草一兩三味入瓦鐺煎濃汁渣再煎濾渣澄清將汁慢火收厚烊入眞陳阿膠一兩然後將前藥杵和乾濕調勻丸如桐子大滾上丹砂末日中晒乾貯銀瓶量孩之大小每服三丸至七丸

透痲散 初見點一二三朝用

前胡一錢 荆芥一錢 連翹二錢 紫蘇一錢

牛蒡子三錢炒研　山查炭三錢　蟬蛻一錢去泥　生甘草三分

右八味爲一劑蘆根或茅根煎湯代水

傷風加防風　頭痛加羌活　腹痛加赤芍　內熱加赤苓　欬嗽加杏仁貝母　傷食加神麯麥芽　氣滯加厚朴枳殼　血熱加紅花紫草　壯熱加葛根山梔　驚悸加柴胡橘紅金箔　便溏去蘆根加茅术　虛弱去前胡加丹皮茯苓　血虛加當歸生地　氣虛加黃耆白术　起遲加川

芎

化漿散　四五六朝用

生黃芪一錢　生萼子三錢炒研　山查炭三錢　粉全當歸一錢　新會皮八分　生地黃三錢　川芎一錢　生甘草三分

右八味爲一劑加竿尖或香菌仍用茅根湯煎痛者加白芷　癢者加天蟲　熟者加犀角黃連漿清加熟地木香　漿不化加角針　餘並如前方加減

回元丹　回漿結痂用

焦白朮一錢土炒　炙甘草一錢　丹皮一錢二分　黃芪一錢蜜炙　茯苓三錢　蟬蛻一錢洗去泥　山藥三錢　白芍二錢

右八味爲一劑薑棗煎　加減隨時斟酌仍依前法

透痂以下三方舉大意以見次第神而明之存乎其人然種花本順利原無藉乎藥力縱有不虞拗不能出此範圍蓋不必服藥者十之八九間有

用藥者十之二二又不得恃其順利而竟置方論於不講也

種痘心法

嘉慶戊辰春三月昭文張海鵬校梓


種痘指掌
撰人不詳

本館叢書集成初編所選借月山房彙鈔及澤古齋重鈔皆收有此書且同一版本借月在先故據以影印

種痘指掌序

種痘一科古方書所未載
御纂醫宗金鑑始備門目提綱挈領學者固可得其宗旨矣但一切看種擇苗之法術家以爲另有秘授作專門衣鉢之計故習是業者苟不得秘授有其法而不敢輕試而人亦不之信良足慨也丙辰春偶得種痘指掌一卷其書不著撰人姓氏論種痘用苗選擇禁忌之法與金鑑足相發明而所謂專門授受者亦不外是夫種痘一法全以人事斡旋造化果循此法行之眞可萬不

失一乃老于醫者猶不免有誤其故有二非見于時痘盛行之日卽出于不宜種痘之兒醫者不守禁忌苟且嘗試致失萬全此豈種痘之咎歟至于種痘之先後維持調護培養本原此又在爲父母者之責并非醫者之任矣篇中誤種救解之法姑備一說或未可盡信又神苗元化丹有其名而秘其方質之吾邑老醫皆無需此而自奏神效或亦以爲姑且惑人之說存而勿論第夏月接苗一法已爲是科鑿破混沌信祕傳也外尚有朱氏種痘秘旨一書略載方劑合而觀之種痘之方盡于

是矣嘉慶戊辰春日黃廷鑑識

種痘指掌

失名

種痘之道如彼嘉穀由苗而秀由秀而實固恃乎種之功尤貴夫苗之美也夫苗之美者有二曰仙苗曰神苗仙苗者不染塵穢之氣神苗者包涵健順之性苟信之者眞而見不介乎疑似藏之也固而氣無使乎洩宣届非寒非暑之時乘天朗氣清之候以無恙之兒施出神之技種則必出出則未有不奏奇功此種痘保全之道要非淺鮮之爲也人自受生之初孕毒潛伏于腎部遇

天瘟流行染觸而出名曰時痘猶鏡中之日光射及而發是亦逼之使然也順痘固多而逆而凶暴者亦復不少領毒達表者主乎氣氣不和則形不鬆載毒外揚者由乎血血不融則色不澤而凡稀密不勻紅紫不一甚或腰疼腹痛嗆嗽音啞隨熱隨出等症氣血雖足不及防備反爲毒肆猶迅雷不及掩耳險逆之禍可勝道哉是知非本然之毒盛遇天時不正之惡癘猝然而行以致此也故有腹痛發班者報點塌陷者種種不一況又值夫外感內傷驚悸客忤一發熱而痘即隨之感乎風

者肌表爲之阻塞感乎寒者腠理爲之氷凝傷乎飲者盪其脾而二便不調傷乎食者停于中而胃氣不暢驚悸則神思散亂客忤則魂魄難收一遇嚴寒酷暑不特調護維艱病者精神亦難支持觀此而種痘之功顧不重歟茲種痘者值天氣暢和之候選神仙有力之苗施于病疔弗染之體男左女右塞于鼻孔微以純陽至健之芳氣逗其深潛未動之元根勿爲邪感勿爲熱侵至三日後頸項二處腫塊先呈俗名喜塊塊越大則痘越稀此佳兆也至六七日間身漸熱而痘出朗朗見點而

身涼者氣血調和裏束完聚頓拔而起神恬氣靜穩保無虞至若無力之苗有遲至七日八日後乃身熱而驟出者此或稀密之不可定甚或延至十餘日身壯熱而湧出者乃繁密難安耳故由種而出出而如期者氣血自和無慮其勞逸無慮其縱橫無傷乎臟腑無耗乎精神身熱不甚二便如常四肢温煖五官明潤目更有神笑容自若自內及外靡一不寧其形自然綻凸其色自然光瑩其顆粒自然圓净縱或稍密界畫枝分成漿回醫必能應期收功勿藥有喜此種痘之所以逾勝時痘

而毫無疑慮者也其或思患預防可服硃砂六一散少許以珠能解骨髓中之毒熟砂能辟邪鎮心使客氣不犯內加金箔調暢氣血可壯中外元神使肌膚色潤滑石療濕結利膀胱清理六腑之邪陽從溺而出甘草和中能解諸毒初出之時如是足矣至于調攝之法不過鈎藤薄荷以治驚甘桔元參以清喉大力蟬蜕以起透升麻葛根以開肌荆芥防風以疏表山查廣皮以順氣川芎紅花以活血丹皮生地以涼血犀角黃連連翹以解熱天蟲白芷以驅風定痒歸芍銀花以滋養成痂以

此類推屈指可數石膏之清細辛蘇黃之散無庸也參芪桂附之温補大黃芒硝之攻伐甲片蜂房胎髮人齒臍帶之發酵無庸也若夫落痂之後或用參芪甘草益其氣歸芍地黃養其血山藥米仁健其脾芪术助其元陽鹿茸河車壯其筋骨補胎元之不足俾一生之强壯若夫未種之先于耳後之筋紋尤當細驗訣曰耳下不宜冷耳上不宜熱耳後驗筋紋温和淡紅色者此兒若與種之出痘包他吉如紋脈細淡全無血色者胎元薄也紋脈全無元不續也濁紋密佈過輪勾轉者毒將熾

也紋色青紫或現青蓮茄花木筆絳桃等色雜乎其間皆血不和也紋粗直硬或根蘗亂或條直豎或更有細碎多頭者皆氣不順故也更有形如蘭花如燈花形粗色異種必焦紫密佈不分顆粒又有青黑細縷相間者勢必夾班密布難透斷不宜種又有形如鋼叉色若生鉄尤不可種及面顏晦滯氣濁神粗則知內脈壅滯亦斷不宜種倘無是諸類者種後忽露急將耳紋惡血連針刺出以犀角地黃湯爲先用透肌湯化下痘至而身不燔灼神不昏迷即其驗也更宜慎者病初愈而元神

未復瘡痍甚而氣血不和皆不宜種也素患腸痛者防蟲種之不消素患食疳者防疳疾復作亦未可種也脾胃常虧者種痘雖佳使元陽外佈內乏温養恐舊疾復作亦宜謹慎也其最險者癘氣已染不顧而種非期而出出則難保此醫家大患也感冒未清鼻息閉塞不辨而種過期不出亦不可不知也時疾偏染彼雖無疾必言其故亦不可妄投也夫既得夫種之之法尤宜講其種之之苗時痘之苗其性不純摠美勿用時痘盛行雖係種苗恐染時邪亦宜謹慎種出之苗或染客症體元

不足苗亦無力兼恐染傳客疾不宜收用新收之苗當下卽種神氣完足其驗雖易不可多用多則必密若越三日後力漸薄而滯氣臻常有瘡毒之患必俟七日元氣復來滯氣退消庶幾無患擇苗者得飽滿肥膩之漿以棉花拭收用若用痘醫取尖細潤澤者時佩身旁護好鮮者其氣壯少用亦無不出宿者多用出者少若再少用則不出者亦有之此不可不知也用時以牙箸研極細末微滴以清水末細則氣宣而易達水潤則滋澤而邪清斷不可火焙火焙則火毒侵惹苗性失而無用

矣彼種痘中之獨後獨大爲報痘之醫其性易于發毒亦不宜用黑燥而厚者不宜用細薄少神者亦不宜用高厚有神者苗可月餘種來必出細薄者半月外其氣已脫種之無益至若因旁人種痘沾染而出其毒與時痘不遠名曰野苗亦不宜用苗固佳矣而用之時候又各有所宜收之即種者宜于秋冬蓄而後種者宜于春夏欲藏之日鼓之者利于速生發之際導之者貴于遲事斯道者得其所宜謹其所戒施治勿涉乎苟且嬰孩得免夭亡豈非盡人力以代天工挽回造化之一端

歟苗之陸續應手不憂無繼者尤賴傳授之得我徒交友之可深信四時之苗惟霉雨鬱蒸之候苗易敗而氣駁最難久貯不得于已必資于人苟相與匪人苗亦難信以不信之苗輕嘗漫試其害立至每率意妄爲希圖僥倖利猶未穩害已隨之良可懼也予不揣固陋瑣瑣繁言質諸當世雖不任灌溉之優渥盡裨嘉穀亦庶幾芟柞之維勤無滋秕稗云爾

用苗忌類

有一等種痘至出時非目紅鼻衄卽喉疼目爛此等痘

苗取以作種出自極易亦有稀者然遇不可種之兒恒多敗事名曰禍苗

一苗有性稀而或有熟發如烙者腹痛不寧者神昏如醉者其狀若驚者直至痘齊始釋此等種類均屬險苗不可收用

一雜苗不可用蓋一人之苗性主于一一則自清數人之苗性主于紛紛則多雜故須一人之苗種之貯苗之器須多如一器中欲藏幾種必用紙各包開明日期并記稀密隨收隨用無不遂意若不分痘之多少不辨日

之遠近醇疵不一即名雜苗又或因苗無幾添以別苗以圖僥倖鮮不敗事

一幼兒稟性希薄種必易出放苗不可過多須覓稀痘苗種其氣不濁不傷元神不可混施以致其咎

一過痘之苗不可用凡兒之氣血調和者得佳苗而用之中外和順全無濁氣故雖同居亦不過若易過者其氣之濁盛可知其或精神完固腠理充實者彼氣雖盛仍不受過至于易過在受過者之氣血亦不能無弊倘因其形色可觀冒然收用禍亦莫測矣

一病人之苗不可用蓋每有種時無病種後或緣外感內傷等症以致血氣不和種類雖嘉元神已缺斷勿謬收以致咎

一毒苗不可用毒苗者不特小兒素有瘡毒之謂或乳母向有陰毒惡癬乳癰串癧等症其氣已毒吮之者有不受其毒乎又或有父母淫污尸死穢觸亦即毒也偶爾相觸有不變乎此二者一受于中一犯于外其或漿水未成而色先老黃同落之醫頻即焦黑無澤此謂毒苗倘一悞用非疔毒如逢即繁密難安其禍非淺也

一火苗不可用火苗者不特小兒舊有痘疾恒多內熱其或乳母體虛火盛或時疾相傳或目疾喉痛其火熾矣吮其乳者有不罹其焰乎以致行漿時熱勢太急漿未足而旋卽干燥其醫厚薄不等嵌肌抓肉鐵硬難脫此爲火苗其或悞用致發熱如烙心神燥烈其狀若驚非小便赤閉卽鼻衄成流矣

一苗性固隹種後有塊至六七日間微微發熱熱至三日見點初有報痘隨發正痘後補贈痘其性最純菊報痘正痘有漿而醫厚其氣性自存種出防密苗宜少用

膿痘醫薄而細其性氣已薄倘或收用恒多不出一苗性本純人力又壯天氣又和耳紋不佳強與之種而偶或僥倖後遂放胆恐多致悔　古人云胎產弗種經久瘧痢弗種瘡毒淋漓勿種

悞種救解法

前論擇苗愼矣偶有擇之不精一時悞用卽觸其毒險狀多端任事者必預將頂好磁石研之極細用活雞一隻剖開滲磁石屑于雞上先煎鐵銹水一碗令兒乘熱廣飲隨將此雞乘熱覆兒背胸上吸去腹內惡毒惡火

其雞卽變青色其兒便覺舒爽此急救之法乘毒未定前務必施之于早也

余于時痘從事有年竊窺一二種痘其道本不相謀而時下售是術者每常棘手往往訪予予用意見少參末議如右所說蓋予嘗于友處揀種痘一書翻閱之餘竊喜十揣九得不相謀而適相合有如斯也篇中所載一粒丹之四丸方詢稱嘉美盡矣畧爲研出至如所云催苗之法于理爲贅何則苗之有力者一種卽出何用催哉或因種而不出遂襲是語而復催之名曰補苗抑知

有禍不勝言者蓋種而不出因毒錮而卒難搖動以竅阻而未易宣達催之能保無後患乎故種而不出不若聽之爲善即欲補種必俟三月已後前之苗性全無然後再種發熟時有汗甚妙不必服藥服之恐碍其說似也然余謂原無感冒因放苗如期而熟兼有微汗則腠理已暢痘自起透發表和中之道固不必矣若再發散將未粗者不齊細小者泯迹又何以彰種痘之功哉況本有選製九丹如期進用誠無事乎藥也但人狃于是說概不服藥有汗無汗並不分清倘或毒乘火熾客痘

橫侵因而大汗猝至可不爲之分解又云項中有核雖大不妨其或未消回後化之余謂是塊也苗性猛而拔周身之毒萃于一處塊之所結毒之所聚也然嘗有久而不消者或消而難化者當時雖或無恙忽乘感觸壅聚咽喉以時毒而觸毒洶湧潰爛而不可救者有矣故經久不消必服清疎之劑重用前胡薄荷加夏枯草等而後可釋其或未消又必于疎透中佐以全蝎貝母角針天蟲牛蒡等藥用生天南星研細醋調圍出其頂俾得微膿而息其毒庶無後患行是道者循習此書旁參

余說種痘之法已見一班矣附錄原書于左

種痘原說

痘之發也本乎時行時順則順時逆則逆明斯旨即可觸類而旁通焉又何痘之不可種哉是法舊云傳自興醫古仙三白眞人憫世間小兒痘患爲最痛苦一遇險逆之症不惟父母哀告無從即名醫亦手足無措患痘者不獨行貌不堪抑亦恐其無及因將種痘一法并所用藥餌相傳以來久而無考三白眞人之名惟傳種痘者知之他未之識也習是法者勿忘神麻庶與小兒有

補云

一小兒自週歲以來即可種痘先看其氣色無諸疾病痛方可放苗漿苗醫苗咸可漿則百發百中醫則間有一二不出體氣壯盛者醫用四枚爲一苗瘦弱之兒用五枚作一苗間二日再用一苗爲催苗取漿苗法用棉花衣于兩手背胸間刺四五點要在漿足之時取之爲妙若于面部取之致有痘痕也收漿後稟氣壯者亦即飽滿如初醫苗可留月餘或半月或二十日漿苗止可留半月若天氣熱者止宜四五日久則氣變而不可用

漿苗醫苗時序人暫之不同揔酌乎天時之寒暑收苗必置于竹節內一頭塞之佩之于身以得人氣不可間斷否則用極細紙包好亦可若天氣暑熱漿苗置竹筒內涼處放好即醫苗亦不宜放身邊蓋天氣炎蒸復加人氣苗驟變矣種而不損者稀矣

一男婦自三十以內亦可種種即如小兒看其氣色等項及諸疾病夫婦分床半月每日服滋陰補血藥一劑半月後始可放苗女則俟其經過方可放苗法或漿苗或醫苗男左女右漿苗塞于鼻內再用些棉花衣以塞

之醫苗若干以牙箸研細少滴清水包花衣內塞于鼻孔再以些花衣蓋之勿令脫出須一周時方可去苗如遇噴嚏或出仍塞鼻內至足七日方發熟熟三日則退而痘自出有熟至七日退者痘亦仍稀間有放苗至九日十日不發熟者如前再放若放苗後一二時間有噴嚏者其氣充暢自必易出出亦必稀

一凡種痘本日即用神皇萱一粒煎湯送通天元化丹

一凡用藥多少法照前所開

一身發熟後見痘或一粒或數粒或數十百至千餘粒眼鼻

不封起居飲食如常間有未熟而先報粒者不必如時看法刺去血無妨也

一種痘切須節飲食愼寒煖勿令驚恐跌蹼及穢氣觸犯年長者戒性忌色餘俱如小兒　忌猪肉鮮者并炒糟辣等物勿烘焙衣服勿烘火爐勿入火箱中臥

一忌用時苗致有變端失名非淺摠以神苗爲美神苗卽種苗也

一用藥法放苗時用預製通天元化丹神皇壹一粒去壳煎湯送下壹不與小兒食至發熱時用清熱一粒丹

起痘時用起痘一粒丹貫漿時用貫漿一粒丹以燈心湯送下

一放苗後兒或多食或跌蹼驚嚇痘形大異種痘者即將所製之藥如期而用亦保無虞倘伊父母必求前劑黃連石膏在所禁用以種痘所感本淺藥味妄投反生不測屢經試驗敢不愼歟

一時痘盛行勿可妄種恐預感天行氣也

一兩頰紅者不可亂種痘發必密預爲說明種亦無妨

一皮肉白而細者種之必稀黑而粗者種之必密

一醫苗取厚而小者爲上

一小兒耳後紋青紫者出痘多紅者出痘少

一發熱時有汗不必服藥服之有碍若發汗則痘乃不出矣所以與時痘異者在此

一發熱時男左女右耳垂腮下有一粒核雖極大不妨因毒聚于此痘反稀矣勿認爲痰毒及痘毒十人中間有一二無此核四五日內自消無形其或未消俟痘回後以化毒散解之

一或有痘疔如時痘法刺之出紫血以硃砂少許和藥

油抹之種之後必看者爲此故也

一發熱時無汗再用通天元化丹一粒燈心湯送下

一凡種家有不種之兒當先與言明頻服發散藥則相繼而出多屬順症否則或有出逆症者殊不便矣莫若一時種之爲妙

一神苗必多方覓取于同道中不得輕用時苗或種之有致死者或種後有發毒致死者俱採時苗之過盞苗性猛烈多致有變若夫神苗其性本柔緩萬無一失倘斷神苗即停不種另覓神苗圖種永不失名種痘者愼

之

一種痘初見極細三日後必自肥大不必嫌其小而用前劑以求起發蓋種痘所感者淺藥性猛烈恐反敗事有一二日不飲食者亦不必服藥痘齊自食或兒體素嬌因痘尤弱亦不必服藥痘齊自強凡一切種痘禁忌前劑重用致有他變

一種痘初見細而白者即痘不甚稀亦勿藥爲尚

一種痘極密與時等亦不必服藥但照後所製九丹如期用之自愈即甚密眼斷不封此種痘之神妙即可領

悟時痘之看法雖云不同摠之種痘感淺時痘感深一用煎劑恐遺後累屢試屢驗慎之慎之

一種家每有用煎劑者或不得製藥之傳或苦于製藥之艱因以煎劑求代往多差失殊不知小兒求安所以種痘即煎劑之遺害未形而湯藥之强吞先苦我家相傳此法以來所種不可勝數從無失悞是知神苗之功既大製藥之法亦妙矣故時苗宜禁製藥宜勤也

是書製藥法製苗藏藥痘多痘少種法險逆二症用藥退之再發順症以及看兒不可種種則必死秘法書內

不及全載必須口授心傳所以杜絕竊書之匪類耳

耳紋訣

蛛網牽絲過耳鈎　根紋細密亂針頭　最嫌深紫渾如漆　又怕塵鋪濁似油　遇著此兒須回絕　種之必定受驚憂

種痘諸法

下藥丹數與人年相配不論男女一歲至三歲三粒四歲五歲四粒六歲七歲五粒八歲九歲六粒十歲十一歲至十六七歲照前加之十八以後不過用十二九而

止然雖有定法倘年長大卽稍加一二丸亦無碍也種後幾日發熱幾日見點幾日上漿幾日回醫幾日收痂發熱摠以七日爲正若小兒本元充足用苗再輕則遲至十日者有之倘四五天卽熱者藥苗之性傳經未過此兒已感時疫于種前所出者時痘而非種痘順固不受功逆亦不任咎種時當時講出然于時痘流行之際莫如不種爲高見點發熱三朝必現至于上漿回醫收痂心經則速脾經則遲未可一格而定大約九十朝

見點十二三朝上漿十六七朝回醫二十日收痂若速

者上漿與回收早一二日耳　種後或發熱而不見痘或不發熱亦不見痘發熱而不見痘者此固小兒痘本稀者于發熱之時或吐或瀉其毒已洩止出一二對故不見也至于不發熱而不見痘必苗宿而用之太輕隔半月重種可也下苗之後見痘標痘疔標用銅刀挑破痘疔亦然疔若甚者以藥搽之倘種痘之日值天朗氣清竟無發標者若遇陰晦之天則恒多發如不挑破則毒過而痘不能起發或現于未發熱之前或現于將見點之際其形大而發癢摠在于兩頤及人中鼻孔下隨

現隨挑若隔幾日其毒凝聚根巳堅必大挑出血爲度疔卽毒類也然疔更甚于發毒種本無疔如或有之其形欠而黑用銅刀挑之以四聖散填入瘡內卽愈 下苗後忌食生冷鷄肉蛋麵難消者等物當用笋尖香菌鯽魚鮮蝦等物作淡薑湯食之令痘起發見點後不必用也 苗有好歹及有毒無毒黑闇無光經紅不淨者必有火毒光明眞潤如蜜蠟者無火毒凡小兒膚本黑色而痂偏微白此必氣血太虛其痂不可用若肌膚本白而痂黑色此又火毒所重亦不堪用并痘出愈稀則

痂中火毒必甚痘出愈密則痂中火毒必輕小兒身上有瘡瘡邊之痘必多于他處其毒聚此收痂時切不可混收以作苗用小兒發熱期必以七日爲正其苗最佳若六日十二日者雖小兒元稟有殊摠不若正七日者之爲妙然用之亦無妨也至若五日而熟者恐夾入時氣斷不可用十日外者究不宜用蓋種痘之道苗爲君而藥爲臣此針線之不可不明也　苗之鮮者有氣可嗅少用宿者重用太宿者不用痘密至三四百粒者其毒已散收痂作苗必重用之夏令人氣外洩苗輕則不

熟不出必重用些方克有濟春令天氣發生之際苗宜輕用且宜選蜜蠟色者用之有火毒者宜慎之惟秋冬二令乃收藏之候即稍帶火氣亦不至有害全于閱歷心參非言語所能盡　用苗多少全看鮮宿鮮而大者三四个宿則遞加耳　藏苗法春季以紙包夾在書內用木板夾好不使出味厚者可用一月或放身邊夏冬用雨水洗淨日內晒乾收在石羔匣內取其寒涼之意大約可用七八日若有苗而無種處欲作度苗之謀將黃蠟兩許以紙包苗作心做爲丸子將竹管刮去外青

以白蜜灌半管以丸子放入再用蠟糊好以木填塞管口縛磚係長線沉于井中可歇兩月春季與秋季同法冬間用紙包好放在身邊一日然後夾好書內亦可二月如臨種時痂有火毒者用和苗藥和之其毒卽解研苗水春秋用温夏用涼冬用熱　苗隔有訣春秋一月苗宜厚微薄只可半月餘惟有夏來性便短冬藏月外有餘零　痘有可種不可種幼稚男女須要辨別其精神如面部有精彩喜色明亮透達印堂三根年壽無青晦之氣滿面紅光純粹上吉可種有病者不種內熱黃

瘦者不種孕婦不種痢疾者不種疳膨食積者不種近隣出時痘者不種未滿五月者不種新婚者不種身有惡瘡者不種皮肉如發麵椽者不種病後元氣未復者不種生大毒正氣未還者不種肌膚傷火未愈者不種慘淡無神者不種若眼中生翳以獨腳將軍草搗爛紮臂上即退在百日內眼內有紅絲者可退在百日外者則難退製藥紮臂法附後　痘後發毒乃火氣未洩透也若用煎劑當發散清火利便不可過用寒涼之品并外敷方附後　種痘發驚在痘前無碍痘後則危凡小

兒面肉肥胖緊瘦兩種當防驚悸現可預告勿使臨時惶恐　痘之稀密在面部上推之若皮寬不緊肉頭鬆泛有神者出痘必稀肉緊皮薄而亮眼暴者出痘當重

看耳後筋紋近世諸家亦爲不少惟吾家所傳之道筋紋則不必拘執若必欲看淡紅清顯是心脾痘淡清顯是肺經痘此爲順症若青筋則險黑筋則逆無筋則大凶而不可種也

耳後筋紋謌

生死輕重天地人　千藤百蔓一根眞　倒灣有葉瘦

須重　橫直無枝痘必輕　細細垂絲知欲死　絲絲蛛網定難生　曰微黑點皆斯類　斷隱難明有十分

種痘指掌終

嘉慶戊辰春二月
昭文張海鵬校刊

王雲五主編

叢書集成初編

海藏痂論萃英及其他三種

中華民國二十五年十二月初版

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

*D六一三四